



## وضعیت اسهال گوساله های شیرخوار

در زمان اسهال گوساله ها، تفکیک نوع رفتار گوساله بسیار حائز اهمیت می باشد. به این صورت که گوساله توانایی ایستادن و مکیدن را دارد یا خیر.

همچنین به رنگ اسهال توجه شود. به طوری که شایع ترین نوع اسهال، اسهال سفید یا اشرشیاکولای می باشد و یکی از راه های پیشگیری از آن می تواند ضدعفونی و شعله دادن دوره ای باکس های گوساله باشد. اندازه گیری دمای بدن در تشخیص نوع اسهال و درمان مورد نیاز اهمیت دارد. به طوری که در اسهال نوع سالمونلا دمای بدن افزایش می یابد. با استفاده از جدول و دیاگرام زیر، نوع روش تشخیصی و درمانی اسهال گوساله ها را تحت بررسی قرار دهید.

نوع تشخیص اسهال در گوساله ها			
دهیدراسیون	نوع رفتار گوساله	چشم های گود رفته <sup>۱</sup>	پوست گردن <sup>۲</sup>
نرمال	نرمال	هیچ	هیچ
متوسط	نرمال تا حدودی افسرده (توانایی ایستادن دارد)	۲-۴ میلی متر	۱-۳ ثانیه
خفیف	افسرده	۴-۶ میلی متر	۲-۵ ثانیه
شدید	بسیار افسرده، توانایی ایستادن و مکیدن را ندارد	۶-۸ میلی متر	۵-۱۰ ثانیه

۱- (فاصله پلک تا کره چشم) مطابق شکل

۲- مدت زمان برگشت پوست گردن به حالت عادی پس از کشیدن





## اسهال گوساله ها

توانایی ایستادن و مکیدن دارد

توانایی ایستادن و مکیدن ندارد

دمای بدن کمتر از  $39/6$  درجه

دمای بدن بیش از  $39/6$  درجه

دمای بدن گوساله ثبت شود

۲ لیتر آب گرم و الکترولیت ۱-۲

بار در روز به مدت ۲ روز متوالی

تماس با دامپزشک پس از ۳ روز

اگر بهبودی حاصل نشد

۲ لیتر آب گرم و الکترولیت ۱-۲

بار در روز به مدت ۲ روز متوالی

تزریق ۲ سی سی آنتی بیوتیک داخل عضلانی

تزریق ۱ سی سی فلونکسین

داخل عضلانی به مدت ۲ روز

تماس با دامپزشک پس از ۲

روز اگر بهبودی حاصل نشد

r